-T-NORA PASTA-BE-FR - MAJMR031025

Nora Pasta

Appât prêt à l'emploi contre les rats et les souris

Nora Pasta est un appât prêt à l'emploi sous forme de pâte, avec une saveur unique très attrayante pour les rongeurs, même en présence d'autres aliments. L'appât est conçu pour lutter contre les rongeurs à l'intérieur et autour des bâtiments.

Consignes d'utilisations

Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation. Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile. Le produit doit être appliqué dans des stations d'appât sécurisées. Inspectez vos stations d'appât tous les 2 à 3 jours pour les souris et tous les 5 à 7 jours pour les rats au début du traitement. Remplacez les appâts consommés ou détériorés. Ensuite, inspectez au moins une fois par semaine pour vérifier si l'appât est accepté et si les stations d'appât n'ont pas été altérées. Retirez les cadavres de rongeurs. Rechargez les stations si nécessaire. Couvrez les galeries et assurez-vous que la zone traitée n'est pas accessible aux animaux domestiques et aux enfants.

Usage contre rats et souris en intérieur : Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.

Usage contre rats et souris en extérieur autour des bâtiments, et usage contre les rats en zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries : Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés. Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement. Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles.

Dosage

Le produit doit être appliqué dans des stations d'appâts sécurisées ou dans des points d'appâts couverts et protégés.

Contre souris (*Mus musculus*), usage intérieur et extérieur autour des bâtiments : 20-30g d'appât par point d'appât espacés de 3 mètres.

Contre rats bruns (*Rattus norvegicus*) et rats noirs (*Rattus rattus*), usage intérieur, extérieur autour des bâtiments, et zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries): 90-100g d'appât par point d'appât espacés de 5 à 10 mètres.



DANGER!

H360D Peut nuire au foetus • H373 Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée • P201 Se procurer les instructions spéciales avant utilisation • P202 Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité • P280 Porter des gants de protection • P308+P313 EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin • P314 Consulter un médecin en cas de malaise • P405 Garder sous clef • P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux, conformément à la réglementation locale



BIOCIDE TP14: RODENTICIDE

TYPE DE FORMULATION

Appât sous forme de pâte prêt à l'emploi

MATIÈRE ACTIVE

Difénacoum 0.005%

MÉCANISME D'ACTION

Anticoagulant, antagoniste de la vitamine K

CODES ET EMBALLAGES

RD-DIF-20086 Seau de 5kg

